Especes	Divisions CIEM	Variations des avis scientifiques	Etat du stock
Aiguillat commun *(Squalus acanthias)*	Atlantique Nord-Est (FAO 27)	-11%	En bon état
Bar *(Dicentrarchus labrax)*	Nord 48°	+8%	En bon état
Baudroies *(Lophiidae)*	7 & 8	-4%	Variable selon le stock
Baudroie noire/rousse (Lophius budegassa)	VII & VIII	-15%	
Baudroie blanche (Lophius piscatorius)	VII & VIII	+2,5%	
Barbue *(Scophthalmus rhombus)*	4,7 d,e	+5%	En bon état
Cabillaud *(Gadus morhua)*	7 b,c-e,k	=	Effondré
Cardines *(Lepidorhombus spp.)*	7 & 8	-	Variable selon le stock
Chinchard *(Trachurus trachurus)*	..7 a-c,e-k...	+7%	En bon état
	4 b,c,7 d	=	Effondré
Eglefin *(Melanogrammus aeglefinus)*	7 b-k	=	Surpêché et dégradé
Hareng *(Clupea harengus)*	4,3a ,7d	+38%	En bon état
Lieu jaune *(Pollachius pollachius)*	6 & 7	-3%	Reconstituable
Lingue franche *(Molva molva)*	7, 8,..	=	Surpêché
Maquereau *(Scomber scombrus)*	Atlantique Nord-Est (FAO 27)	+102%	Surpêché et dégradé
Merlan (Merlangius merlangius)	7 b-c,e-k	=	Effondré
	4,7d	-47%	En bon état
	VIII,IXa	-33%	
Merlu *(Merluccius merluccius)*	7 & 8	-15%	En bon état
Plie *(Pleuronectes platessa)*	7 d	-4%	Effondré
	7 e	=	Surpêché
	7 f,g	-32%	Surpêché et dégradé
	7 h,j,k	-3%	Reconstituable
Raies *(Rajidae)*	7 a-c,e-k	<	Variable selon le stock
Raies *(Rajidae)*	7 d	=	Variable selon le stock
Raie brunette *(Raja undulata)*	7 d,e	-11%	En bon état
Thon Rouge *(Thunnus thynnus)*	Atlantique Nord-Est (FAO 27)	=	En bon état
Germon *(Thunnus alalunga)*	Atlantique Nord-Est (FAO 27)	+6%	En bon état
Sole *(Solea solea)*	7 d	-87%	Effondré
	7 e	-16%	En bon état
Sole *(Solea solea)*	7 f,g	-2%	Surpêché
	7 h,j,k	-20%	Inconnu
	8 a,b	-9%	Reconstituable